

ABVD 療法

診断名：ホジキンリンパ腫

○投与スケジュール(1 コース 28 日間)

Day1、15……ドキシソルピシン(DXR) div 25mg/m²
Day1、15……ブレオ(BLM) div 9mg/m² (max15 mg/body)
Day1、15……エクザール(VLB) iv 6mg/m²
Day1、15……ダカルバジン(DTIC) div 375mg/m²

★血管痛の予防のため遮光して投与。

Day1……イメンド125mg 1C

Day2～3……イメンド80mg 1C 朝

Day2～4……デカドロン錠0.5mg 16錠 朝・昼食後

☆縦隔への放射線照射をする場合、肺臓炎発生のリスクが高まるため、BLM の総投与量は120mg(4コース)

進行期症例ではABVD療法を8コース施行する。(国立がんセンター中央病院)

○減量基準

2500 ≤ WBC ≤ 3500 もしくは 7.5 万 ≤ PLT ≤ 10 万 → DXR と VLB の投与量を 75% に減量

WBC < 2500 もしくは PLT < 7.5 万 → すべての薬剤の投与を延期、PaO₂ ≤ 70mmHg → BLM の投与を一時中止

○注意事項

BLM による肺障害は致死的になりうるため、原因不明の発熱や乾性咳嗽、息切れなどの呼吸器症状には要注意。