

CP + アバスチン療法

FN 低：催吐性 中

対象疾患：進行非小細胞癌（非扁平上皮癌）

<投与スケジュール>（1コース21日）

Day 1…パクリタキセル（PAC） div 200 mg/m²

Day 1…カルボプラチン（CBDCA） AUC 6 mg/ml・min

カルバートの式に基づき計算。（1000 mg/回上限）

※カルバートの式：投与量（mg/body）= 目標 AUC ×（Ccr+2.5）

※Cockcroft&Gault の式：女性では×0.85

$Ccr = ((140 - \text{年齢}) \times \text{体重(kg)}) / (72 \times Cr(\text{mg/dL}))$

Day 1…アバスチン div 15 mg/kg

Day 2～3…デカドロン錠0.5mg 16錠 分2朝・昼

<注意事項>

1. 併用療法終了後、アバスチンのみの単独投与あり。（1コース21日、前投薬なし、PDまで）
2. 血痰、咯血等の出血傾向の患者、または大血管の側にある腫瘍、空洞を伴う陰影がある患者は禁忌。（出血のリスクがあるため）
3. 抗凝固療法や NSAIDs 投与中の患者、脳転移のある患者には慎重投与。（出血のリスクがあるため）
4. 好中球減少に注意
5. 過敏反応予防のため、必ず前投薬を行うこと。パクリタキセル投与後10分以内は特に注意が必要。
6. パクリタキセルには100mgあたりビール約150mLに相当するアルコールが含まれているため、アルコールに弱い体質の患者は注意。

2019年9月2日より施行