

## アブラキサン・カルボプラチン療法

FN 低：催吐性 中  
診断名： 進行非小細胞肺癌

<投与スケジュール> (1コース21日)

Day 1、8、15……アブラキサン (nab-PTX) div 100 mg/m<sup>2</sup>

血漿分画製剤の同意書をとること。

Day 1……カルボプラチン (CBDCA) div AUC 6 mg/ml・

カルバートの式に基づき計算。(900 mg/回上限)

※カルバートの式：投与量 (mg/body) = 目標 AUC × (Ccr + 2.5)

※Cockcroft&Gault の式：女性では×0.85

$Ccr = ((140 - \text{年齢}) \times \text{体重(kg)}) / (72 \times Cr(\text{mg/dL}))$

<注意事項>

1. 初回投与前に血漿分画製剤の同意書をとること。  
(アブラキサンはアルブミン製剤のため)
2. 投与時にはインラインフィルターを使用せず、泡立ちに注意すること。  
(アルブミン製剤のため)

<投与延期基準>

ANC < 1,500/mm<sup>3</sup>、PLT < 10 万/mm<sup>3</sup>

高度な末梢神経障害 (Grade3)、皮膚障害 (Grade2) が発現した場合には、回復 (Grade 1 以下) するまで延期

<減量基準>

7日間 ANC < 500/mm<sup>3</sup>、PLT < 5 万/mm<sup>3</sup>、発熱性好中球減少症、  
高度な末梢神経障害 (Grade3)、皮膚障害 (Grade2) が発現した場合

2019年9月2日より施行