

# キイトルーダ・アリムタ・シスプラチン療法

FN 低：催吐性 高

診断名：進行非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）

<投与スケジュール>（1コース21日）

\*平均4コース施行

Day 1…キイトルーダ（ペムブロリズマブ）      div 200 mg/body

Day 1…アリムタ（MTA）      div 500 mg/m<sup>2</sup>

Day 1…シスプラチン（CDDP）      div 75 mg/m<sup>2</sup>

Day 1…イメンド125 mg      1C

Day 2～3…イメンド80 mg      1C 朝

<注意事項>

★アリムタ初回投与の7日以上前

- ・パンビタン末（1日1回1g）：連日経口投与
- ・メチコバル注（1回0.5mg×2）：筋肉注射（9週ごとに投与）

※投与を中止又は終了する場合は、最終投与日から22日目までパンビタン末を投与する。

★尿量をチェックする。

投与日から3日間まで24時間蓄尿する。

Day1のみ開始～9時間尿量2500mL以下でフロセミド20mg iv

★NSAIDsは併用注意

投与2日前から2日後の5日間はできる限り併用を控える。（骨髄抑制、腎毒性、消化器毒性が増強する。）

副作用早期発見のために、定期的に血液検査等を実施する。（検査セットを使用）