

イミフィンジ療法

FN：－ 催吐性：－

診断名：非小細胞肺癌

○投与スケジュール（1 コース 28 日間）

Day1（点滴）：イミフィンジ 1500mg/body

○注意事項

★投与期間の上限は12か月

★根治的化学放射線療法後

副作用

●自覚症状がある副作用

発疹 15.4%、疲労 13.1%、下痢 9.7%、食欲減退 5.7%、悪心 5.5%、
関節痛 4.4%

●重大な副作用

- ・重度の下痢 0.4%
- ・間質性肺疾患 9.7%（初期症状として咳、息切れ、発熱などが現れることがあります。）
- ・肝機能障害 0.8%、肝炎 0.4%
- ・腎障害：急性腎障害 2.1%、腎不全 0.2%
- ・重度の神経障害：1.2%
- ・重度の皮膚障害：発疹 0.6%
- ・インフュージョンリアクション 2.5%
- ・甲状腺機能障害：甲状腺機能低下症 8.2%
- ・1型糖尿病 0.4%
- ・下垂体機能障害：下垂体炎 0.4%、機能低下症 0.3%
- ・副腎機能不全 0.2%
- ・横紋筋融解症 頻度不明
- ・重症筋無力症 0.1%

2023 年作成