

XELOX療法

FN:低 催吐性:中

診断名:胃癌

○投与スケジュール(1コース21日)

Day1(点滴):エルプラット(L-OHP) div 130mg/m²

Day1~14(内服):ゼローダ錠 po 2000mg/m² 朝・夕食後に内服

Day2~3(内服):デカドロン錠 0.5mg 16錠 分2 朝・昼服用

○注意事項

・エルプラット特有の有害事象:手・足や口唇周囲等の感覚異常又は知覚不全が本剤投与直後からほとんど全例にあらわれる。冷たい飲み水や氷の使用を避け、低温時には皮膚を露出しないこと。末梢神経症状の悪化や回復遅延が認められると、手、足等がしびれて文字を書きにくい、ボタンをかけにくい、飲み込みにくい、歩きにくい等の感覚性の機能障害があらわれることがある。

・ゼローダの有害事象(承認時):手足症候群 50%、悪心・下痢・口内炎・食欲不振 20~25%他

*エルプラット注:アレルギー発現注意!! 累積投与量が 401mg/m² 以上 or 半年以上休薬あり再投与する場合は重篤なアレルギー反応を惹起する可能性あり。再投与の意義がリスクを上回ると考えられる場合は、前投薬の強化などを考慮する。

<強化例>前投薬にガスター注 20mg + ポララミン注 5mg を追加