

カドサイラ tri-weekly 療法

診断名: HER2 陽性の手術不能例又は再発乳がん
(トラスツズマブ及びタキサン系の治療歴のある患者)

○投与スケジュール(1 コース 21 日間)

Day1(点滴): カドサイラ 3.6mg/kg
1 段階減量: 3.0mg/kg 2 段階減量: 2.4mg/k

○注意事項

ハーセプチン及びタキサン系抗悪性腫瘍剤の治療歴のある患者に投与
国内第Ⅱ相臨床試験: 鼻出血 41.1%、血小板減少 27.4%、AST 増加 20.5%、
ALT 増加 11.0%、心障害 8.2%

血小板数減少、AST、ALT 増加はサイクル 1 の Day8 付近で最悪値を示すため検査値のモニタリングが推奨されている。

○AST、ALT 増加による休薬、減量及び中止基準

Grade 2 (>3~5×ULN) 減量せず継続
Grade 3 (>5~20×ULN) 休薬: Grade 2 以下に回復後、1 段階減量して再開
Grade 4 (>20×ULN) 中止

○血小板減少症による休薬及び減量基準

Grade 3 (<50,000~25,000/mm³) 休薬: Grade 1 以下(75,000/mm³以上)に回復後、減量せず再開可能
Grade 4 (<25,000/mm³) 休薬: Grade 1 以下(75,000/mm³以上)に回復後、1 段階減量して再開可能