

パージェタ・ハーセプチン・ハラヴェン療法

FN - : 催吐性 最小度

診断名 : HER2 陽性の転移・再発乳がん

○投与スケジュール(1 コース 21 日間)

Day1(点滴): パージェタ 初回 840mg/body 2 回目以降 420mg/body

Day1(点滴): ハーセプチン 初回 8mg/kg 2 回目以降 6mg/body

Day1, 8(点滴): ハラヴェン 1.4mg/m²

1 段階減量: 1.1mg/m² 2 段階減量: 0.7mg/m²

○投与時の注意点

選択基準: ベースラインの LVEF ≥ 50% (心エコー又は MUGA スキャンで測定)

1. 心障害対策: ハーセプチン投与前、投与開始後 6 カ月～1 年以内に、心機能を評価する。
2. パージェタを単独投与した場合の有効性及び安全性は確立していない。
3. パージェタの投与調整: 前回投与日から 6 週間以上の投与間隔が空く場合は、改めて初回投与量の 840mg で投与を行う。
4. ハーセプチンの投与調整: 前回投与日から 6 週間以上の投与間隔が空く場合は、改めて初回投与量の 8mg/kg で投与を行う。
5. パージェタ投与後の経過観察時間は infusion reaction 症状を確認するための時間であり、2 回目以降、問題がなければ省略可能。(infusion reaction は主に初回投与時の投与中又は投与開始後 24 時間以内に出現することが多い。)