

## ゲムシタビン・TS-1 併用療法

診断名: 膵癌・術前

○投与スケジュール(1コース21日)

Day 1～ 14(内服): S-1            80 mg/m<sup>2</sup>

1日2回 朝・夕食後に内服。14日間服用後7日間休薬。

Day 1, 8……ゲムシタビン(GEM) div 1000 mg/m<sup>2</sup>

<S-1 投与量>

EVD	投与量
4158p <sup>5</sup> 未満	;3p j2gd  <sup>※</sup>
4158～418p <sup>5</sup>	433p j2gd
418p <sup>5</sup> 以上	453p j2gd

○注意事項

・原則2コース

・ゲムシタビン投与に1時間かけると毒性の増強の報告あり。

・肺障害対策

→ラ音、自覚症状、検査にて早期発見に努める。SPO<sub>2</sub>、KL-6、DLco を投与前、症状出現時に測定する。DLco: 15%以上の低下、70%以下では嚴重注意。

・延期・減量基準

→グレード2非血液毒性、グレード3血液毒性: 投与延期

→グレード3非血液毒性、グレード4血液毒性: 投与延期、次回1段階減量

減量: ゲムシタビン(-200mg/m<sup>2</sup>/day)、TS-1(-20mg/day)