

カルセド療法

FN 中：催吐性中

診断名：小細胞肺癌

○投与スケジュール（1 コース 21 日間）

Day1～3（点滴）：カルセド 40mg/m²

○注意事項

1. 投与時に血管炎、静脈炎を起こすことがあるので、注射部位に注意すること。
2. 投与後、尿中排泄により尿が赤色になることがある。
3. 骨髄抑制の nadir は投与開始後、13～14 日目である。

g rade 3 or 4 ANC 減少 83.3%、WBC 減少 70%、Hg 減少 33.3%、PLT 減少 20%、食欲不振 15%、疲労感 15%、低 Na 血症 8.3%、嘔吐 5%、発熱性 ANC 減少 5%

○投与開始前の規定

初回投与時：WBC \geq 4000/mm³、ANC \geq 2000/mm³、PLT \geq 10 万/mm³、
Hg \geq 9g/dL、AST・ALT \leq 100U/L、T-bil \leq 1.5mg/dL、LVEF \geq 50%

次 course 開始時：ANC \geq 1500/mm³、PLT \geq 10 万/mm³、非血液毒性 \leq G I

○減量規定

4 日間 WBC $<$ 1000/mm³、4 日間 ANC $<$ 500/mm³、PLT $<$ 2 万/mm³、
非血液毒性 \geq GIII、発熱性 ANC 減少症

○中止基準

6 週間過ぎても次 course 投与不可。PD。