

ハイカムチン療法 (second line 以降)

FN 低：催吐性 中

診断名：小細胞肺癌

○投与スケジュール (1 コース 21 日間)

Day1~5 (点滴)：ハイカムチン 1.0mg/m²

○注意事項

1. 初回投与時：WBC4,000/mm³ 以上 12,000/mm³ 以下、PLT10 万/mm³ 以上、Hb9.5 g/dL 以上を確認。2 コース目以降の投与時：WBC4,000/mm³ 以上、PLT10 万/mm³ 以上を確認。腎障害 (Ccr 20~39ml/min) のある患者では、初回投与量は通常用量の半量とする。
2. 投与後、血液学的検査値の変動に十分留意し、次コースの投与量は患者の状態により適宜増減すること。

○減量基準

投与後 WBC1,000/mm³ 未満又は PLT3 万/mm³ 未満の場合、次コースは 0.8 mg/m²/日へ減量する。

| 増減量の段階 | 投与量 |
|--------|--------------------------|
| 初回投与量 | 1.0 mg/m ² /日 |
| 1 段階減量 | 0.8 mg/m ² /日 |

○有害事象 (国内後期第 II 相臨床試験)

WBC 減少 99.0%、ANC 減少 97.9%、RBC 減少 91.3%、Hb 減少 90.8%、PLT 減少 84.5%、悪心嘔吐 57.5%、食欲不振 57.0%、脱毛 28.5%、発熱 24.2%、易疲労感 21.7%

2019 年 9 月 2 日より施行