

ジェブタナ+プレドニン療法

診断名:ドセタキセル治療歴のある前立腺癌

○投与スケジュール(1 コース 21 日間)

Day 1 ……ジェブタナ(CBZ) div 25mg/m²

Day1～連日(内服):プレドニン錠 10mg 分2 朝・昼食後

Day 2 ……ジーラスタ皮下注 3.6mg 皮下注

○注意事項

- ・添付溶解液にエタノールが含まれているため、アルコールに過敏な患者は慎重投与
- ・重篤な過敏反応があらわれることがある。過敏反応は投与開始から数分以内に起こることがあるので、投与開始 1 時間は頻回にバイタルサインのモニタリングを行うなど、患者の状態を十分に観察すること

国内第 I 相臨床試験 Grade 3 以上の主な副作用…好中球減少症 100%、発熱性好中球減少症 54.5%、貧血 25% 等

○減量・休薬・中止基準

副作用	処置
適切な治療にも関わらず持続する Grade 3 以上の好中球減少症(1 週間以上)	好中球数が 1,500/mm ³ を超えるまで休薬し、その後、用量を 20mg/m ² に減量して投与を再開する。
発熱性好中球減少症又は好中球減少性感染	症状が回復又は改善し、好中球数が 1,500/mm ³ を超えるまで休薬し、その後、用量を 20mg/m ² に減量して投与を再開する。
Grade 3 以上の下痢、又は水分・電解質補給等の適切な治療にも関わらず持続する下痢	症状が回復又は改善するまで休薬し、その後、用量を 20mg/m ² に減量して投与を再開する。
Grade 3 以上の末梢性ニューロパチー	投与を中止する。
Grade 2 の末梢性ニューロパチー	用量を 20mg/m ² に減量する。

#

2019 年 9 月 2 日より施行

#