

I. 医薬品について

1. 新規採用検討医薬品 4品目4規格（常時採用1品目1規格、要時採用2品目2規格、院外採用1品目1規格）

No	医薬品名	一般名	薬効	薬価	メーカー名	採用区分	代替削除
1	マイスタン錠5mg	クロバザム	他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかんの下記発作型における抗てんかん薬との併用 部分発作 単純部分発作、複雑部分発作、二次性全般化強直間代発作 全般発作 強直間代発作、強直発作、非定型欠伸発作、ミオクロニー発作、脱力発作	¥18.1	住友ファーマ	☆要時採用	-
2	オフサグリーン静注用25mg	インドシアニングリーン	網脈絡膜血管の造影	¥1,381.0	参天製薬	☆要時採用	-
3	サムタス点滴静注用8mg	トルバプタンリン酸エステルナトリウム	ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留	¥1,160.0	大塚製薬	常時採用	-
4	ピレーズトリエアロスフィア120吸入	ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物	慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎、肺気腫）の諸症状の緩解（吸入ステロイド剤、長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入β2刺激剤の併用が必要な場合）	¥8,771.9	アストラゼネカ	院外採用	-

☆緊急決裁

2. 供給停止に伴う切り替え採用医薬品について 1品目1規格（常時採用1品目1規格）

No	医薬品名	一般名	メーカー名	薬価	薬効	申請者 (申請科)	採用区分
1	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	セフェピム塩酸塩	サンド	¥395.0	一般感染症 発熱性好中球減少症	本田 (薬剤部)	常時採用

3. 後発品への切り替えについて 1品目1規格（常時採用1品目1規格）

No	変更前	薬価	変更後	薬価	薬効	申請者 (申請科)	採用区分
1	フェブリック錠20mg (帝人ファーマ)	¥49.5	フェブキシスタット錠20mg「DSEP」 (第一三共エスファ)	¥13.9	痛風、高尿酸血症 がん化学療法に伴う高尿酸血症	本田 (薬剤部)	常時採用

4. 採用区分変更について 1品目1規格

No	医薬品名	一般名	薬効	備考
1	生理食塩液PL「フソー」(2L)	生理食塩液	1.細胞外液欠乏時、Na欠乏時、Cl欠乏時 2.注射剤の溶解希釈剤 3.皮膚・創傷面・粘膜の洗浄・湿布、含嗽・噴霧吸入剤として 4.気管支粘膜洗浄・喀痰排出促進 5.医療用器具の洗浄	要時採用から常時採用へ

5. 削除検討医薬品について 5品目5規格（常時採用2品目2規格、要時採用2品目2規格、院外採用1品目1規格）

No	医薬品名	一般名	薬効	削除理由	採用区分
1	フラビタン錠5mg/10mg	フラビンアデニンジヌクレオチド	1. ビタミンB2欠乏症の予防及び治療 2. ビタミンB2の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患、妊産婦、授乳婦、はげしい肉体労働時など） 3. 下記疾患のうち、ビタミンB2の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合 口角炎、口唇炎、舌炎、口内炎 肛門周囲及び陰部びらん 急・慢性湿疹、脂漏性湿疹 ペラグラ 尋常性ざ瘡、酒さ 日光皮膚炎 結膜炎 びまん性表層角膜炎、角膜部周雑充血、角膜脈管新生 （上記3.に対して、効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない。）	販売中止のため	院外採用
2	フェブリク錠20mg	フェブキソスタット	痛風、高尿酸血症 がん化学療法に伴う高尿酸血症	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」へ切り替えのため	常時採用
3	0.02%マスキ水	クロルヘキシジングルコン酸塩	結膜囊の洗浄・消毒 産婦人科・泌尿器科における外陰・外性器の皮膚消毒	0.5%マスキ水採用に伴う切替削除	常時採用
4	マイスタン錠5mg	クロバザム	他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかんの下記発作型における抗てんかん薬との併用 部分発作 単純部分発作、複雑部分発作、二次性全般化強直間代発作 全般発作 強直間代発作、強直発作、非定型欠神発作、ミオクロニー発作、脱力発作	患者限定で採用。使用患者の退院に伴う院内削除	要時採用
5	レバチオ錠20mg	シルデナフィルクエン酸塩	肺動脈性肺高血圧症	入院患者の使用頻度がないため院内削除	要時採用