

I.医薬品について

1. 新規採用医薬品 7品目7規格（要時採用6品目6規格、院外採用1品目1規格）

| No | 医薬品名                        | 一般名                            | 薬効  | 薬 価        | メーカー名   | 採用区分 | 代替削除                          |
|----|-----------------------------|--------------------------------|---|------------|---------|------|-------------------------------|
| 1  | ピロイ点滴静注100mg                | ソルベツキシマブ                       | CLDN18.2陽性の治癒切除不能な進行・再発の胃癌  | ¥54,502    | アステラス製薬 | 要時採用 | -                             |
| 2  | イシュド点滴静注300mg               | トレメリムマブ                        | 切除不能な肝細胞癌   | ¥2,310,355 | アストラゼネカ | 要時採用 | -                             |
| 3  | プレベナー20水性懸濁注                | 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン               | ○高齢者又は肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる者<br>肺炎球菌（血清型1、3、4、5、6A、6B、7F、8、9V、10A、11A、12F、14、15B、18C、19A、19F、22F、23F及び33F）による感染症の予防<br>○小児<br>肺炎球菌（血清型1、3、4、5、6A、6B、7F、8、9V、10A、11A、12F、14、15B、18C、19A、19F、22F、23F及び33F）による侵襲性感染症の予防 | 未収載        | ファイザー   | 要時採用 | バクニューバ<br>ンス水性懸<br>濁注シリン<br>ジ |
| 4  | ヌバキソビッド筋注                   | 組換えコロナウイルス<br>(SARS-CoV-2)ワクチン | SARS-CoV-2による感染症の予防   | 未収載        | 武田薬品工業  | 要時採用 | -                             |
| 5  | ペボタスチンベシル酸塩OD錠<br>10mg「トーワ」 | ペボタスチン                         | <成人><br>○アレルギー性鼻炎<br>○蕁麻疹<br>○皮膚疾患に伴うそう痒（湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚そう痒症）<br><小児><br>○アレルギー性鼻炎<br>○蕁麻疹<br>○皮膚疾患（湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症）に伴うそう痒   | ¥11.5      | 東和薬品    | 要時採用 | -                             |
| 6  | アリケイス吸入液590mg               | アミカシン                          | 適応菌種<br>アミカシンに感性的マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス（MAC）<br>適応症<br>マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス（MAC）による肺非結核性抗<br>酸菌症  | ¥38,437.9  | インスメッド  | 要時採用 | -                             |
| 7  | アクテムラ皮下注162mg<br>オートインジェクター | トシリズマブ                         | 既存治療で効果不十分な下記疾患<br>○関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）<br>○高安動脈炎、巨細胞性動脈炎  | ¥32,608    | 中外製薬    | 院外採用 | -                             |

2.メーカー変更（本部共同入札） 14品目15規格（常時採用10品目11規格、要時採用4品目4規格）

| No | 医薬品名(変更前)                 | メーカー名            | 薬価      | 医薬品名(変更後)                     | メーカー名            | 薬価      | 採用区分 |
|----|---------------------------|------------------|---------|-------------------------------|------------------|---------|------|
| 1  | 献血ヴェノグロブリンIH5%静注2.5g/50mL | 日本血液製剤機構         | ¥19,485 | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL    | 日本血液製剤機構         | ¥20,165 | 要時採用 |
| 2  | オゼンピック皮下注0.25mg SD        | ノボノルディスク<br>ファーマ | ¥1,376  | オゼンピック皮下注2mg                  | ノボノルディスク<br>ファーマ | ¥10,879 | 要時採用 |
| 3  | ケラチナミンコーワクリーム20%          | 興和               | ¥4.1/g  | 尿素クリーム20%「SUN」                | サンファーマ           | ¥3.5/g  | 常時採用 |
| 4  | ウリトスOD錠0.1mg              | 杏林製薬             | ¥46.7   | イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」          | キョーリンリメディオ       | ¥17.8   | 常時採用 |
| 5  | イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」  | 東和薬品             | ¥2,388  | イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」       | 日本化薬             | ¥2,460  | 常時採用 |
| 6  | イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」   | 東和薬品             | ¥1,058  | イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」        | 日本化薬             | ¥1,107  | 常時採用 |
| 7  | ラクツロースシロップ65%「タカタ」        | 高田製薬             | ¥4.9/mL | ラクツロースシロップ65%「NIG」            | 日医工              | ¥4.9/mL | 常時採用 |
| 8  | ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」    | 東和薬品             | ¥8.7    | ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」         | 日本ジェネリック         | ¥7.2    | 常時採用 |
| 9  | 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」       | 吉田製薬             | ¥5.7    | 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」          | 健栄製薬             | ¥5.7    | 常時採用 |
| 10 | シチコリン注500mg/2mL「日医工」      | 日医工              | ¥60     | ニコリンH注射液0.5g                  | 武田テバ薬品           | ¥340    | 常時採用 |
| 11 | シュアポスト錠0.5mg              | 住友ファーマ           | ¥31.6   | レバグリニド錠0.5mg「サワイ」             | 沢井製薬             | ¥13.7   | 常時採用 |
| 12 | ノベルジン錠50mg                | ノーベルファーマ         | ¥321.6  | 酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」                | 沢井製薬             | ¥148.3  | 要時採用 |
| 13 | トレアキシシン点滴静注用100mg         | シンバイオ製薬          | ¥77,392 | ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」 | 東和薬品             | ¥30,888 | 要時採用 |
| 14 | ヘバクト配合顆粒                  | 日本ケミファ           | ¥72.2   | リーバクト配合顆粒                     | EAファーマ           | ¥134    | 常時採用 |
| 15 | トメントール「ホエイ」               | ヴィアトリス・ヘルス<br>ケア | ¥26.9/g | トメントール「コザカイ・M」                | 小堺製薬             | ¥20.4/g | 常時採用 |

3.販売中止・出荷停止に伴う代替採用医薬品 5品目5規格（常時採用4品目4規格、院外採用1品目1規格）

| No | 変更前                            | 薬価       | 変更後                           | 薬価       | 薬効  | 採用区分 |
|----|--------------------------------|----------|-------------------------------|----------|---|------|
| 1  | ハリゾンシロップ100mg/mL               | ¥50.9/mL | ファンギゾンシロップ100mg/mL            | ¥54.6/mL | 消化管におけるカンジダ異常増殖   | 常時採用 |
| 2  | セフカベンピボキシル塩酸塩細粒<br>小児用10%「トーワ」 | ¥77/g    | セフカベンピボキシル塩酸塩細粒<br>小児用10%「TW」 | ¥77/g    | 経口用セフェム系抗生物質製剤  | 院外採用 |
| 3  | メトロプロラミド錠5mg「NIG」              | ¥5.7     | メトロプロラミド錠5mg「トーワ」             | ¥5.7     | ○次の場合における消化器機能異常（悪心・嘔吐・食欲不振・腹部膨満感）<br>胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胆嚢・胆道疾患、腎炎、尿毒症、乳幼児嘔吐、薬剤（制癌剤・抗生物質・抗結核剤・麻酔剤）投与時、胃内・気管内挿管時、放射線照射時、開腹術後<br>○X線検査時のバリウムの通過促進 | 常時採用 |
| 4  | スルピリド細粒10%「アメル」                | ¥6.3/g   | スルピリド錠50mg「サワイ」               | ¥6.4     | ○統合失調症<br>○うつ病・うつ状態   | 常時採用 |
| 5  | セフトラジジム静注用1g「VTRS」             | ¥686     | セフトラジジム静注用1g「CHM」             | ¥304     | セフェム系抗生物質製剤   | 常時採用 |

4. 採用区分変更

| No | 変更前  | 変更後  | 医薬品名                     | 一般名        | 薬効  |
|----|------|------|--------------------------|------------|---|
| 1  | 常時採用 | 要時採用 | ファンギゾンシロップ100mg/mL       | アムホテリシンB   | 消化管におけるカンジダ異常増殖   |
| 2  | 常時採用 | 要時採用 | フェキシソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「NP」 | フェキシソフェナジン | ○アレルギー性鼻炎<br>○蕁麻疹<br>○皮膚疾患（湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、アトピー性皮膚炎）に伴うそう痒  |
| 3  | 常時採用 | 要時採用 | レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田ハ」      | レボセチリジン    | [成人]<br>○アレルギー性鼻炎<br>○蕁麻疹、湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚そう痒症<br>[小児]<br>○アレルギー性鼻炎<br>○蕁麻疹、皮膚疾患（湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症）に伴うそう痒 |

5. 削除医薬品 23品目24規格（常時採用18品目19規格、要時採用4品目4規格、院外採用1品目1規格）

| No | 医薬品名                           | 一般名              | 薬効  | 採用区分 |
|----|--------------------------------|------------------|---|------|
| 1  | ハリゾンシロップ100mg/mL               | アムホテリシンB         | 消化管におけるカンジダ異常増殖   | 常時採用 |
| 2  | セフカベンピボキシル塩酸塩細粒<br>小児用10%「トーフ」 | セフカベン            | 経口用セフェム系抗生物質製剤  | 院外採用 |
| 3  | メトロプロラミド錠5mg「NIG」              | メトロプロラミド         | ○次の場合における消化器機能異常（悪心・嘔吐・食欲不振・腹部膨満感）<br>胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胆嚢・胆道疾患、腎炎、尿毒症、乳幼児嘔吐、薬<br>剤（制癌剤・抗生物質・抗結核剤・麻酔剤）投与時、胃内・気管内挿管時、<br>放射線照射時、開腹術後<br>○X線検査時のバリウムの通過促進   | 常時採用 |
| 4  | スルピリド細粒10%「アメル」                | スルピリド            | ○統合失調症<br>○うつ病・うつ状態   | 常時採用 |
| 5  | セフトアジジム静注用1g「VTRS」             | セフトアジジム          | セフェム系抗生物質製剤   | 常時採用 |
| 6  | バクテリナックス水性懸濁注シリンジ              | 沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン | ○高齢者又は肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる者<br>における肺炎球菌（血清型1、3、4、5、6A、6B、7F、9V、14、18C、19A、<br>19F、22F、23F及び33F）による感染症の予防<br>○小児における肺炎球菌（血清型1、3、4、5、6A、6B、7F、9V、14、<br>18C、19A、19F、22F、23F及び33F）による侵襲性感染症の予防 | 常時採用 |
| 7  | ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」<br>（角ボトル）  | ポビドンヨード          | 手術部位（手術野）の皮膚の消毒、手術部位（手術野）の粘膜の消毒、皮<br>膚・粘膜の創傷部位の消毒、熱傷皮膚面の消毒、感染皮膚面の消毒   | 常時採用 |
| 8  | ポビドンヨード外用液10%「明治」              | ポビドンヨード          | 手術部位（手術野）の皮膚の消毒、手術部位（手術野）の粘膜の消毒、皮<br>膚・粘膜の創傷部位の消毒、熱傷皮膚面の消毒、感染皮膚面の消毒   | 常時採用 |
| 9  | 献血ヴェノグロブリンIH5%静注2.5g/50mL      | 人免疫グロブリン         | 低並びに無ガンマグロブリン血症、重症感染症における抗生物質との併用、<br>特発性血小板減少性紫斑病等   | 要時採用 |
| 10 | オゼンピック皮下注0.25mg SD             | セマグルチド           | 2型糖尿病   | 要時採用 |
| 11 | ケラチナミンコーワクリーム20%               | 尿素クリーム           | 魚鱗癬、老人性乾皮症、アトピー皮膚、進行性指掌角皮症、足趾部皸裂性皮<br>膚炎、掌跖角化症、毛孔性苔癬  | 常時採用 |
| 12 | ウリトスOD錠0.1mg                   | イミダフェナシン         | 過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁   | 常時採用 |
| 13 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーフ」       | イリノテカン           | ○小細胞肺癌<br>○非小細胞肺癌<br>○子宮頸癌<br>○卵巣癌<br>○胃癌（手術不能又は再発）<br>○結腸・直腸癌（手術不能又は再発）  | 常時採用 |
| 14 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーフ」        | イリノテカン           | ○乳癌（手術不能又は再発）<br>○有棘細胞癌<br>○悪性リンパ腫（非ホジキンリンパ腫）<br>○小児悪性固形腫瘍<br>○治癒切除不能な肺癌  | 常時採用 |
| 15 | ラクツロースシロップ65%「タカタ」             | ラクツロース           | ○高アンモニア血症に伴う下記症候の改善<br>精神神経障害、手指振戦、脳波異常<br>○産婦人科術後の排ガス・排便の促進<br>○小児における便秘の改善  | 常時採用 |

|    |                        |                 |   |      |
|----|------------------------|-----------------|---|------|
| 16 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「トロー」 | ウルソデオキシコール酸     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○下記疾患における利胆</li> <li>胆道（胆管・胆のう）系疾患及び胆汁うっ滞を伴う肝疾患</li> <li>○慢性肝疾患における肝機能の改善</li> <li>○下記疾患における消化不良</li> <li>小腸切除後遺症、炎症性小腸疾患</li> <li>○外殻石灰化を認めないコレステロール系胆石の溶解</li> <li>○原発性胆汁性肝硬変における肝機能の改善</li> <li>○C型慢性肝疾患における肝機能の改善</li> </ul>   | 常時採用 |
| 17 | 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」    | 酸化マグネシウム        | <ul style="list-style-type: none"> <li>○下記疾患における制酸作用と症状の改善</li> <li>胃・十二指腸潰瘍、胃炎（急・慢性胃炎、薬剤性胃炎を含む）、上部消化管機能異常（神経性食思不振、いわゆる胃下垂症、胃酸過多症を含む）</li> <li>○便秘症</li> <li>○尿路シュウ酸カルシウム結石の発生予防</li> </ul>   | 常時採用 |
| 18 | シチコリン注500mg/2mL「日医工」   | シチコリン           | <ul style="list-style-type: none"> <li>○頭部外傷に伴う意識障害、脳手術に伴う意識障害</li> <li>○脳卒中片麻痺患者の上肢機能回復促進</li> <li>ただし、発作後1年以内で、リハビリテーション及び通常の内服薬物療法（脳代謝賦活剤、脳循環改善剤などの投与）を行っている症例のうち、下肢の麻痺が比較的軽度なもの。</li> <li>○下記疾患に対する蛋白分解酵素阻害剤との併用療法</li> <li>1) 急性膵炎</li> <li>2) 慢性再発性膵炎の急性増悪期</li> <li>3) 術後の急性膵炎</li> <li>○脳梗塞急性期意識障害</li> </ul> | 常時採用 |
| 19 | シュアポスト錠0.5mg           | レバグリニド          | 2型糖尿病   | 常時採用 |
| 20 | ノベルジン錠50mg             | 酢酸亜鉛            | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ウイルソン病（肝レンズ核変性症）</li> <li>○低亜鉛血症</li> </ul>   | 要時採用 |
| 21 | トリアキシン点滴静注用100mg       | ベンダムスチン         | <ul style="list-style-type: none"> <li>○低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫</li> <li>○再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫</li> <li>○腫瘍特異的T細胞輸注療法の前処置</li> </ul>   | 要時採用 |
| 22 | ヘバアクト配合顆粒              | インロイシン・ロイシン・バリン | 食事摂取量が十分にもかかわらず低アルブミン血症を呈する非代償性肝硬変患者の低アルブミン血症の改善  | 常時採用 |
| 23 | トメントール「ホエイ」            | トメントール          | 芳香・矯臭・矯味の目的で調剤に用いる  | 常時採用 |
| 24 | サイトテック錠200             | ミソプロストール        | 非ステロイド性消炎鎮痛剤の長期投与時にみられる胃潰瘍及び十二指腸潰瘍  | 常時採用 |

6.販売移管 2品目4規格（院外採用2品目4規格）

| No | 医薬品名            | 旧メーカー名     | 新メーカー名 | 採用区分 |
|----|-----------------|------------|--------|------|
| 1  | ベルソムラ錠15mg、20mg | MSD        | 第一三共   | 院外採用 |
| 2  | テトラミド錠10mg、30mg | オルガノン、第一三共 | オルガノン  | 院外採用 |