

I. 医薬品について

1.販売中止、供給停止に伴う切り替え採用医薬品について 7品目9規格（常時採用1品目2規格、要時採用2品目2規格、院外採用4品目5規格）

No	変更前	薬価	変更後	薬価	薬効	採用区分
1	パクリタキセル点滴静注液 100mg/16.7mL「ホスピーラ」	¥2,416.0	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	¥5,241.0	○卵巣癌 ○非小細胞肺癌 ○乳癌 ○胃癌 ○子宮体癌 ○再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌	常時採用
2	パクリタキセル点滴静注液 30mg/5mL「ホスピーラ」	¥1,652.0	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	¥1,652.0	○再発又は遠隔転移を有する食道癌 ○血管肉腫 ○進行又は再発の子宮頸癌 ○再発又は難治性の胚細胞腫瘍（精巣腫瘍、卵巣腫瘍、性腺外腫瘍）	常時採用
3	ハイゼントラ20%皮下注 4g/20mL	¥40,166.0	ハイゼントラ20%皮下注 4g/20mLシリンジ	¥40,315.0	○無又は低ガンマグロブリン血症 ○慢性炎症性脱髄性多発根神経炎の運動機能低下の進行抑制（筋力低下の改善が認められた場合）	要時採用
4	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg 「NP」	¥23.1	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg 「YD」	¥10.1	○アレルギー性鼻炎 ○蕁麻疹 ○皮膚疾患（湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、アトピー性皮膚炎）に伴うそう痒	要時採用
5	トスフロキサシントシル酸塩錠 150mg「タナベ」	¥28.6	トスフロキサシントシル酸塩錠 150mg「サワイ」	¥28.6	ニューキノロン系抗菌薬	院外採用
6	スターシス錠30mg	¥10.1	ナテグリニド錠30mg「日医工」	¥10.1	2型糖尿病における食後血糖推移の改善 ただし、下記のいずれかの治療で十分な効果が得られない場合に限る。 [1]食事療法・運動療法のみ [2]食事療法・運動療法に加えてα-グルコシダーゼ阻害剤を使用	院外採用
7	スターシス錠90mg	¥24.6	ナテグリニド錠90mg「日医工」	¥17.7	[3]食事療法・運動療法に加えてビッグアナイド系薬剤を使用 [4]食事療法・運動療法に加えてチアソリジン系薬剤を使用	院外採用
8	エピナスチン塩酸塩錠20mg「テバ」	¥15.8	エピナスチン塩酸塩錠20mg「JG」	¥15.8	○気管支喘息 ○アレルギー性鼻炎 ○蕁麻疹、湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、痒疹、そう痒を伴う尋常性乾癬	院外採用
9	ソタコール錠40mg	¥110.5	ソタコール塩酸塩錠40mg「TE」	¥40.0	生命に危険のある下記の再発性不整脈で他の抗不整脈薬が無効か、又は使用できない場合： 心室頻拍、心室細動	院外採用

2. 削除医薬品について 10品目12規格（常時採用1品目2規格、要時採用5品目5規格、院外採用4品目5規格）

No	医薬品名	一般名	薬効	採用区分
1	パクリタキセル点滴静注液 100mg/16.7mL「ホスピーラ」	パクリタキセル	○卵巣癌 ○非小細胞肺癌 ○乳癌 ○胃癌 ○子宮体癌 ○再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌	常時採用
2	パクリタキセル点滴静注液 30mg/5mL「ホスピーラ」	パクリタキセル	○再発又は遠隔転移を有する食道癌 ○血管肉腫 ○進行又は再発の子宮頸癌 ○再発又は難治性の胚細胞腫瘍（精巣腫瘍、卵巣腫瘍、性腺外腫瘍）	常時採用
3	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン	○無又は低ガンマグロブリン血症 ○慢性炎症性脱髄性多発根神経炎の運動機能低下の進行抑制（筋力低下の改善が認められた場合）	要時採用
4	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg 「NPJ」	フェキソフェナジン	○アレルギー性鼻炎 ○蕁麻疹 ○皮膚疾患（湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、アトピー性皮膚炎）に伴うそう痒	要時採用
5	ミルセラ注シリンジ100μg	エポエチン ベータ ヘゴル	腎性貧血	要時採用
6	ノボラピッド注 100単位/mL	インスリン アスパルト	インスリン療法が適応となる糖尿病	要時採用
7	ベラサスLA錠60μg	ベラプロストナトリウム	肺動脈性肺高血圧症	要時採用
8	トスフロキサシントシル酸塩錠150mg 「タナベ」	トスフロキサシン	ニューキノロン系抗菌薬	院外採用
9	スターシス錠30mg	ナテグリニド	2型糖尿病における食後血糖推移の改善 ただし、下記のいずれかの治療で十分な効果が得られない場合に限る。 [1]食事療法・運動療法のみ	院外採用
10	スターシス錠90mg	ナテグリニド	[2]食事療法・運動療法に加えてα-グルコシターゼ阻害剤を使用 [3]食事療法・運動療法に加えてビッグアニド系薬剤を使用 [4]食事療法・運動療法に加えてチアソリジン系薬剤を使用	院外採用
11	エピナスチン塩酸塩錠20mg「テバ」	エピナスチン	○気管支喘息 ○アレルギー性鼻炎 ○蕁麻疹、湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、痒疹、そう痒を伴う尋常性乾癬	院外採用
12	ソタコール錠40mg	ソタロール	生命に危険のある下記の再発性不整脈で他の抗不整脈薬が無効か、又は使用できない場合： 心室頻拍、心室細動	院外採用

3. 採用区分変更 1品目1規格

No	変更前	変更後	医薬品名	一般名	薬効
1	常時採用	要時採用	チウラジール錠50mg	プロピルチオウラシル	甲状腺機能亢進症

4. 販売移管について 5品目5規格（常時採用4品目4規格、要時採用1品目1規格）

No	医薬品名	旧メーカー名	新メーカー名	採用区分
1	ボースデル内用液10	Meiji Seikaファルマ、協和キリン	Meiji Seikaファルマ、健栄製薬	常時採用
2	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」	協和キリン	テルモ	常時採用
3	イノバン注0.3%シリンジ	協和キリン	テルモ	常時採用
4	エスワンタイホウODT20/2.5	岡山大鵬薬品、大鵬薬品工業	岡山大鵬薬品	常時採用
5	ホリナート錠2.5タイホウ	岡山大鵬薬品、大鵬薬品工業	岡山大鵬薬品	要時採用

5. 名称変更 1品目1規格（常時採用1品目1規格）

No	旧医薬品名	新医薬品名	メーカー名	採用区分
1	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	テルモ	常時採用