

2025年度 第9回 薬剤委員会（開催日：2026年1月28日（水））

I.医薬品について

1.新規採用医薬品 3品目5規格(常時採用1品目2規格、要時採用1品目1規格、院外採用1品目2規格)

No	医薬品名	一般名	薬効	薬価	メーカー名	採用区分	代替削除
1	エルネオバNF1号輸液1000mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	経口・経腸管栄養補給が不能又は不十分で、経中心静脈栄養に頼らざるを得ない場合の水分、電解質、カロリー、アミノ酸、ビタミン、亜鉛、鉄、銅、マンガン及びヨウ素の補給	¥1,244	大塚製薬工場	常時採用	エルネオバNF1号輸液1500mL /フルカリック1号輸液903mL
2	エルネオバNF2号輸液1000mL			¥1,336		常時採用	エルネオバNF2号輸液1500mL /フルカリック2号輸液1,003mL
3	フィコンバ点滴静注用2mg	ペランバネル	一時的に経口投与ができない患者における、下記の治療に対するペランバネル経口製剤の代替療法 ○てんかん患者の部分発作（二次性全般化発作を含む） ○他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の強直間代発作に対する抗てんかん薬との併用療法	¥1,962	エーザイ	要時採用	—
4	トルカブ錠160mg	カビバセルチブ	内分泌療法後に増悪したPIK3CA、AKT1又はPTEN遺伝子変異を有するホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌	¥11,116.2	アストラゼネカ	院外採用	—
5	トルカブ錠200mg			¥13,493.2		院外採用	—

2.販売中止に伴う代替採用医薬品 7品目9規格(常時採用5品目6規格、要時採用2品目3規格)

1	ヒアルロン酸Na0.5眼粘弾剤1%MV 「センジュ」	¥3,225.3	ヒアルロン酸Na0.5眼粘弾剤1%MV 「わかもと」	¥3,225.3	白内障手術・眼内レンズ挿入術・全層角膜移植術における手術補助	常時採用
2	カルボプラチニ点滴静注液150mg 「サンド」	¥2,183	カルボプラチニ点滴静注液150mg 「日医工」	¥3,417	○頭頸部癌、肺小細胞癌、睾丸腫瘍、卵巣癌、子宫頸癌、悪性リンパ腫、非小細胞肺癌、乳癌、子宮体癌 ○以下の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法	常時採用
3	カルボプラチニ点滴静注液450mg 「サンド」	¥4,966	カルボプラチニ点滴静注液450mg 「日医工」	¥4,966	小児悪性固形腫瘍（神経芽腫・網膜芽腫・肝芽腫・中枢神経系胚細胞腫瘍、再発又は難治性のユーリング肉腫ファミリー腫瘍・腎芽腫）	常時採用
4	オキサリプラチニ点滴静注液 50mg/10mL「ホスピーラ」	¥2,502	オキサリプラチニ点滴静注液 50mg「NK」	¥2,502	○治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 ○結腸癌における術後補助療法 ○治癒切除不能な膀胱癌	要時採用
5	オキサリプラチニ点滴静注液 100mg/20mL「ホスピーラ」	¥5,198	オキサリプラチニ点滴静注液 100mg「NK」	¥5,198	○胃癌 ○小腸癌	要時採用
6	エトボシド点滴静注液100mg 「サンド」	¥1,301	ペプシド注100mg	¥2,835	○肺小細胞癌、悪性リンパ腫、急性白血病、睾丸腫瘍、膀胱癌、続毛性疾患、胚細胞腫瘍（精巣腫瘍、卵巣腫瘍、性腺外腫瘍） ○以下の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法 小児悪性固形腫瘍（ユーリング肉腫ファミリー腫瘍・横紋筋肉腫・神経芽腫・網膜芽腫・肝芽腫その他原発悪性腫瘍・腎芽腫その他原発悪性腫瘍等） ○腫瘍特異的T細胞輸注療法の前処置	常時採用
7	ヘプスプリン筋注用200単位	¥8,838	抗HBs人免疫グロブリン筋注 200単位/1mL「JB」	¥19,242	新生児のB型肝炎予防（原則として、沈降B型肝炎ワクチンとの併用）	要時採用
8	ミグリトールOD錠50mg 「トーワ」	¥10.4	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	¥10.6	糖尿病の食後過血糖の改善（ただし、食事療法・運動療法を行っている患者で十分な効果が得られない場合、又は食事療法・運動療法に加えてスルホニルウレア剤、ビグアナイド系薬剤若しくはインスリン製剤を使用している患者で十分な効果が得られない場合に限る。）	常時採用
9	グリメビリドOD錠1mg「トーワ」	¥10.4	グリメビリドOD錠1mg「日医工」	¥10.4	2型糖尿病（ただし、食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合に限る。）	常時採用

3. 後発品（バイオ後続品を含む）への切替 3品目3規格(要時採用3品目3規格)

No	医薬品名(変更前)	メーカー名	薬価	医薬品名(変更後)	メーカー名	薬価	採用区分
1	ザイティガ錠250mg	ヤンセンファーマ	¥3,759.3	アビラテロン酢酸エスチル錠250mg 「DSEP」	第一三共 エスファ	¥1,632.3	要時採用
2	クレナфин爪外用液10%	科研	¥1,396.8	エフィナコナゾール爪外用液10% 「科研」	科研	¥676.3	要時採用
3	ハラヴエン静注1mg	エーザイ	¥51,456	エリブリンメシリ酸塩静注液1mg	選定中	¥26,758	要時採用

4. 削除医薬品 19目23規格(常時採用8品目11規格、要時採用10品目11規格、院外採用1品目1規格)

No	医薬品名	一般名	業 効	採用区分
1	ザイティガ錠250mg	アビラテロン	○去勢抵抗性前立腺癌 ○内分泌療法未治療のハイリスクの予後因子を有する前立腺癌	要時採用→院外採用
2	クレナфин爪外用液10%	エフィナコナゾール	爪白癬	要時採用→院外採用
3	ハラヴエン静注1mg	エリブリン	手術不能又は再発乳癌、悪性軟部腫瘍	要時採用→削除
4	ヒアルロン酸Na0.5眼粘弾剤1%MV 「センジュー」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	白内障手術・眼内レンズ挿入術・全層角膜移植術における手術補助	常時採用→削除
5	カルボプラチニ点滴静注液150mg 「サンド」	カルボプラチニ	○頭頸部癌、肺小細胞癌、睾丸腫瘍、卵巣癌、子宮頸癌、悪性リンパ腫、非小細胞肺癌、乳癌、子宮体癌 ○以下の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法	常時採用→削除
6	カルボプラチニ点滴静注液450mg 「サンド」		小児悪性固体腫瘍（神経芽腫、網膜芽腫、肝芽腫、中枢神経系胚細胞腫瘍、再発又は難治性的ユーリング肉腫ファミリー腫瘍・腎芽腫）	常時採用→削除
7	オキサリプラチニ点滴静注液 50mg/10mL「ホスピーラ」	オキサリプラチニ	○治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 ○結腸癌における術後補助療法 ○治癒切除不能な膀胱癌	要時採用→削除
8	オキサリプラチニ点滴静注液 100mg/20mL「ホスピーラ」		○胃癌 ○小腸癌	要時採用→削除
9	エトボシド点滴静注液100mg 「サンド」	エトボシド	○肺小細胞癌、悪性リンパ腫、急性白血病、睾丸腫瘍、膀胱癌、絨毛性疾患、胚細胞腫瘍（精巣腫瘍、卵巣腫瘍、性腺外腫瘍） ○以下の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法 小児悪性固体腫瘍（ユーリング肉腫ファミリー腫瘍、横紋筋肉腫、神経芽腫、網膜芽腫、肝芽腫その他肝原発悪性腫瘍、腎芽腫その他腎原発悪性腫瘍等） ○腫瘍特異的T細胞輸注療法の前処置	要時採用→削除
10	ヘプスプリン筋注用200単位	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	新生児のB型肝炎予防（原則として、沈降B型肝炎ワクチンとの併用）	常時採用→削除
11	ミグリトールOD錠50mg 「トーワ」	ミグリトール	糖尿病の食後過血糖の改善（ただし、食事療法・運動療法を行っている患者で十分な効果が得られない場合、又は食事療法・運動療法に加えてスルホニルウレア剤、ビグアナイド系薬剤若しくはインスリン製剤を使用している患者で十分な効果が得られない場合に限る）	常時採用→削除
12	グリメビリドOD錠1mg 「トーワ」	グリメビリド	2型糖尿病（ただし、食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合に限る。）	常時採用→削除
13	エルネオバNF1号輸液1500mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	経口・経腸管栄養補給が不能又は不十分で、経中心静脈栄養に頼らざるを得ない場合の水分、電解質、カロリー、アミノ酸、ビタミン、亜鉛、鉄、銅、マンガン及びヨウ素の補給	常時採用→削除
14	エルネオバNF2号輸液1500mL			常時採用→削除
15	フルカリック1号輸液1,354.5mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	経口、経腸管栄養補給が不能又は不十分で、経中心静脈栄養に頼らざるを得ない場合の水分、電解質、カロリー、アミノ酸及びビタミンの補給。	常時採用→削除
16	フルカリック2号輸液1,504.5mL			常時採用→削除
17	プラザキサカブセル110mg	ダビガトラン	非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制	要時採用→院外採用
18	シプロキサン錠100mg	シプロフロキサシン	ニューキノロン系経口抗菌剤	院外採用→削除

19	オクソラレン錠10mg	メトキサレン	尋常性白斑	要時採用→院外採用
20	メンクアッドフィ筋注	4価髄膜炎菌ワクチン	髄膜炎菌（血清群A、C、W及びY）による侵襲性髄膜炎菌感染症の予防	要時採用→削除
21	シベレstatt Na点滴静注用 100mg「ニブロ」	シベレstatt	全身性炎症反応症候群に伴う急性肺障害の改善	常時採用→削除
22	アーテン錠(2mg)	トリヘキシフェニジル	○特発性パーキンソニズム ○その他のパーキンソニズム（脳炎後、動脈硬化性） ○向精神薬投与によるパーキンソニズム・ジスキネジア（遅発性を除く）・アカシジア	要時採用→削除
23	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒	黄連解毒湯	比較的体力があり、のぼせぎみで顔色赤く、いらいらする傾向のある次の諸症 鼻出血、高血圧、不眠症、ノイローゼ、胃炎、二日酔、血の道症、めまい、動悸、湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症	要時採用→削除

5. 採用区分変更

No	変更前	変更後	医薬品名	一般名	薬効	備考
1	院外採用	要時採用	ケレンディア錠10mg	フィネレノン	○2型糖尿病を合併する慢性腎臓病 ただし、末期腎不全又は透析施行中の患者を除く。 ○慢性心不全 ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。	10mg錠と20mg錠の生物学的同等性が示されていないため

6. 販売移管

	医薬品名	旧メーカー名	新メーカー名	採用区分
1	エクメット配合錠LD	製版：ノバリテイスファーマ 販売：住友ファーマ	製版：ノバリテイスファーマ 販売：ノバリテイスファーマ	院外採用
2	エクメット配合錠HD			
3	各種「NIG」製品	製版：日医工 販売：武田薬品工業	製版：日医工 販売：日医工	常時採用