

2026年度 第4回 薬剤委員会（開催日：2026年7月29日（水））

I.医薬品について

1. 新規採用医薬品 6品目7規格（常時採用1品目1規格、要時採用3品目3規格、院外採用2品目2規格）

No	医薬品名	一般名	薬効	薬 価	メーカー名	採用区分	代替削除
1	メトピロンカプセル250mg	メチラボン	○下垂体ACTH分泌予備能の測定 ○クッシング症候群	¥1,211.2	セオリアファーマ	要時採用	なし
2	注射用GHRP科研100	ブラルモレリン	成長ホルモン分泌不全症の診断	¥6,230.0	科研製薬	要時採用	なし
3	バリモディアXR錠0.4mg	ベマフィブラート	高脂血症（家族性を含む）	¥94.4	興和	院外採用	なし
4	フリュザクラカプセル1mg	フルキンチニブ	がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	¥6,167.3	武田薬品工業	院外採用	なし
5	フリュザクラカプセル5mg	フルキンチニブ	がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	¥28,640.3	武田薬品工業	院外採用	なし
6	アザルフィジンEN錠250mg	サラゾスルファピリジン	関節リウマチ	¥14.0	あゆみ製薬	要時採用	アザルフィジンEN錠 500mg
7	タケキャブ錠10mg	ボノブラザン	○胃潰瘍、十二指腸潰瘍、逆流性食道炎、低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制 ○下記におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃MALTリンパ腫、免疫性血小板減少症、早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎	¥91.6	武田薬品工業	常時採用	タケキャブ錠20mg

2.後続品（バイオ後続品を含む）への切替 1品目1規格（常時採用1品目1規格）

No	医薬品名(変更前)	メーカー名	薬 価	医薬品名(変更後)	メーカー名	薬 価	採用区分
1	ルセンティス硝子体内注射用キット 10mg/mL	ノバルティス	¥92,753.0	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット 10mg/mL「センジュ」	千寿製薬	¥72,136.0	常時採用

3.限定出荷・販売中止に伴う代替採用医薬品 5品目5規格（常時採用2品目2規格、要時採用2品目2規格、院外採用1品目1規格）

No	変更前	薬価	変更後	薬価	薬 効	採用区分
1	おたふくかぜ生ワクチン 「第一三共」	未収載	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン 「タケダ」	未収載	おたふくかぜの予防	常時採用
2	スマトリブタン錠50mg「SPKK」	¥119.6	スマトリブタン錠50mg「アメル」	¥84.6	片頭痛	常時採用
3	メトクロプラミド錠5mg 「トーワ」	¥10.8	メトクロプラミド錠5mg「NIG」	¥10.8	○次の場合における消化器機能異常（悪心・嘔吐・食欲不振・腹部膨満感） 胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胆嚢・胆道疾患、腎炎、尿毒症、乳幼児嘔吐、薬剤（制癌剤・抗生物質・抗結核剤・麻酔剤）投与時、胃内・気管内挿管時、放射線照射時、開腹術後 ○X線検査時のバリウムの通過促進	要時採用
4	ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	¥108.6	ポリコナゾール錠50mg「タカタ」	¥131.1	○下記の重症又は難治性真菌感染症 ・ 侵襲性アスペルギルス症、肺アスペルギローマ、慢性壊死性肺アスペルギルス症 ・ カンジダ血症、食道カンジダ症、カンジダ腹膜炎、気管支・肺カンジダ症 ・ クリプトコックス髄膜炎、肺クリプトコックス症 ・ フサリウム症 ・ スケドスポリウム症 ○造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防	要時採用
5	バルサルタンOD錠80mg 「トーワ」	¥12.2	バルサルタン錠80mg「サワイ」	¥12.2	高血圧症	院外採用

4. 削除医薬品 14品目14規格（常時採用7品目7規格、要時採用2品目2規格、院外採用5品目5規格）

No	医薬品名	一般名	薬効	採用区分
1	アザルフィジンEN錠500mg	サラソスルファピリジン	関節リウマチ	要時採用→院外採用
2	ルセンティス硝子体内注射用 キット10mg/mL	ラニビズマブ	○中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性症 ○網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫 ○病的近視における脈絡膜新生血管 ○糖尿病黄斑浮腫	常時採用→削除
3	おたふくかぜ生ワクチン 「第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	おたふくかぜの予防	常時採用→削除
4	スマトリブタン錠50mg 「SPKK」	スマトリブタン	片頭痛	常時採用→削除
5	メトクロプラミド錠5mg 「トーフ」	塩酸メトクロプラミド	○次の場合における消化器機能異常（悪心・嘔吐・食欲不振・腹部膨満感） 胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胆嚢・胆道疾患、腎炎、尿毒症、乳幼児嘔吐、薬剤 （制癌剤・抗生物質・抗結核剤・麻酔剤）投与時、胃内・気管内挿管時、放射 線照射時、開腹術後 ○X線検査時のバリウムの通過促進	常時採用→院外採用
6	ポリコナゾール錠50mg 「DSEP」	ポリコナゾール	○下記の重症又は難治性真菌感染症 ・侵襲性アスペルギルス症、肺アスペルギローマ、慢性壊死性肺アスペルギル ス症 ・カンジダ血症、食道カンジダ症、カンジダ腹膜炎、気管支・肺カンジダ症 ・クリプトコックス髄膜炎、肺クリプトコックス症 ・フサリウム症 ・スクドスポリウム症 ○造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防	常時採用→院外採用
7	シングレア細粒4mg	モンテルカスト	気管支喘息	院外採用→削除
8	リボバス錠10	シンバスタチン	高脂血症、家族性高コレステロール血症	院外採用→削除
9	レニベース錠5	エナラプリル	○本態性高血圧症、腎性高血圧症、腎血管性高血圧症、悪性高血圧 ○下記の状態で、ジギタリス製剤、利尿剤等の基礎治療剤を投与しても十分な 効果が認められない場合 慢性心不全（軽症～中等症）	院外採用→削除
10	MS冷シップ「タイボウ」	dl-カンフルトメントール サリチル酸メチル	下記における鎮痛・消炎 捻挫、打撲、筋肉痛、関節痛、骨折痛	院外採用→削除
11	エクラーローション0.3%	デプロドン	○湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮症、ピダール苔癬、日光皮膚炎、皮脂欠乏性湿 疹、脂漏性皮膚炎を含む） ○薬疹・中毒疹 ○虫さされ ○痒疹群【じん麻疹様苔癬、ストロフルス、結節性痒疹（固定じん麻疹）を含む】 ○乾癬 ○紅皮症 ○紅斑症（多形滲出性紅斑、ダリエ遠心性環状紅斑） ○ジベル蓄微色秕糠疹 ○掌跖膿疱症 ○特発性色素性紫斑（マヨッキーマズル、シャンパーニュ病） ○円形脱毛症	院外採用→削除

12	ケフラルカプセル250mg	セファクロル	<適応菌種> 本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、大腸菌、クレブシエラ属、プロテウス・ミラビリス、インフルエンザ菌 <適応症> ○表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症 ○外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎 ○咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染 ○膀胱炎、腎盂腎炎 ○麦粒腫 ○中耳炎 ○歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎 ○猩紅熱	要時購入→院外採用
13	ロフェジピンカプセル10mg 「サワイ」	ニフェジピン	○本態性高血圧症、腎性高血圧症 ○狭心症	常時採用→院外採用
14	タケキャブ錠20mg	ボノブラザン	○胃潰瘍、十二指腸潰瘍、逆流性食道炎、低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制、非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制 ○下記におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃MALTリンパ腫、免疫性血小板減少症、早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎	常時採用→院外採用

5.販売移管 1品目1規格（要時採用1品目1規格）

No	医薬品名	旧メーカー名	新メーカー名	採用区分
1	ベナンボックス注用300mg	サノフィ	Medical Parkland	要時採用